

OZNAČAVANJE
OPERIL 0,05% sprej za nos za odrasle

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA

OPERIL 0,05% sprej za nos za odrasle

oksimetazolinklorid

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV DJELATNIH TVARI

1 ml otopine sadrži 0,5 mg oksimetazolinklorida.

3. POPIS POMOĆNIH TVARI

Pomoćne tvari: benzalkonijev klorid, natrijev hidroksid, natrijev dihidrogenfosfat dihidrat, natrijev hidrogenfosfat dihidrat, pročišćena voda

4. FARMACEUTSKI OBLIK I SADRŽAJ

sprej za nos, otopina
10 ml

5. NAČIN I PUT(EVI) PRIMJENE LIJEKA

Lijek se primjenjuje lokalno.

6. POSEBNO UPOZORENJE DA LIJEK TREBA ČUVATI IZVAN DOHVATA I POGLEDA DJECE

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

7. DRUGA POSEBNA UPOZORENJA (UKOLIKO JE POTREBNO)

Prije uporabe pažljivo pročitajte priloženu Uputu o lijeku.

8. ROK VALJANOSTI

Rok valjanosti do:

9. POSEBNE MJERE ČUVANJA

Lijek čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

10. POSEBNE MJERE ZA UKLANJANJE NEISKORIŠTENOG LIJEKA ILI OTPADNIH MATERIJALA KOJI POTJEČU OD LIJEKA, KADA JE POTREBNO

11. IME I ADRESA NOSITELJA ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Nositelj odobrenja: Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska

12. BROJ(EVI) ODOBRENJA ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET

Klasa rješenja: UP/I-530-09/12-02/270

13. BROJ SERIJE

Broj serije:

14. NAČIN PROPISIVANJA LIJEKA

Lijek se izdaje bez recepta.

15. UPUTE ZA UPORABU

Način uporabe:

Odrasli i djeca starija od 7 godina: 1 - 2 inhalacije u svaku nosnicu, 2 - 3 puta na dan

16. PODACI NA BRAILLOVOM PISMU

Operil sprej za nos